



Dépistage du cancer du col de l'utérus, d'ITSS et d'autres maladies infectieuses	
<b>La cytologie pour personne avec un corps natal du genre féminin et active sexuellement débute à 21 ans. Reportez le dépistage à plus tard si non active sexuellement. Dépistage au trois ans. Aucun prélèvement de VPH.</b>	
<i>Chlamydia et blennorragie (gonorrhée)</i>	
Dépistez tous les personnes de corps natal féminin si moins de 25 ans. Personnes de corps natal masculine – selon les facteurs de risques	Prélèvement d'urine, vaginal* ou du col de l'utérus (utilisez les premiers 10 ou 20 ml d'urine, c'est préférable d'éviter la miction pour deux heures avant le prélèvement, mais non nécessaire.)
Dépistez tous ceux qui sont symptomatique ou qui ont eu avec une personne infectée.	Chez les personnes de corps natal féminin utilisez un prélèvement d'urine ou vaginal. Corps natal masculine utiliser l'urine.
* L'auto-prélèvement vaginal peut être utilisé. Il faut donner des instructions adéquates pour un bon auto-prélèvement.	
Facteurs de risque: <ul style="list-style-type: none"> <li>Un nouveau partenaire sexuel, plusieurs partenaires sexuels, un partenaire avec des partenaires concurrents, un partenaire avec une ITSS.</li> <li>Utilisation du préservatif non-consistant lorsque le couple est non monogame</li> <li>ITSS existante ou antérieure</li> <li>Population à risque – prisonniers, recrues militaires, clients de Clinique d'ITSS, certaines communautés</li> </ul>	
<b>VIH</b>	
Facteurs de risque <ul style="list-style-type: none"> <li>Personnes de corps natal masculin ayant des relations avec autres personnes de corps natal masculin</li> <li>Utilisateurs d'aiguille pour injection</li> <li>Ceux avec un ITSS ou demandant un dépistage d'ITSS</li> <li>Rapports sexuels vaginal ou anal non-protégés</li> <li>Partenaires sexuels vivant avec le VIH, bisexuel, ou utilisant des aiguilles</li> <li>Échange de sexe pour des drogues, de l'argent ou autres</li> </ul>	Dépistez tous individus étant actif sexuellement
Syphilis	Dépistez tout ceux ayant des facteurs de risque, comprenant une prévalence élevée dans la communauté
Hépatite B	Dépistez ceux ayant des facteurs de risque Facteurs de risque: <ul style="list-style-type: none"> <li>Personnes de corps natal masculin</li> <li>ayant des relations avec autres personnes de corps natal masculin</li> <li>Utilisateurs d'aiguilles pour injections de toutes drogues</li> <li>Personnes séropositives pour le HIV</li> <li>Personnes vivant ou ayant des relations sexuelles avec un individu infecté avec l'hépatite B</li> <li>Personnes nées dans un pays avec une prévalence élevées d'hépatite B</li> </ul>
Hépatite C	Dépistez ceux à risque Facteurs de risques: <ul style="list-style-type: none"> <li>Utilisateurs de drogues par voies intraveineuses ou nasales</li> <li>Tatouages hors d'une boutique réglementés,</li> <li>Contacts et comportements sexuels à haut risque</li> <li>Autres expositions percutanées</li> </ul>
VPV, Herpes simplex	Dépistage primaire non recommandé

Lignes directrices canadiennes sur les infections transmissibles sexuellement <http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/index-fra.php>, SPSTF [www.uspreventiveservicestaskforce.org](http://www.uspreventiveservicestaskforce.org), SOGC <https://sogc.org/fr/index.html>

Questions d'ordre sexuelle	
Partenaires	Relations sexuelles avec des hommes, femmes, les deux ou avec les gens de genre non-conforme ? Nombres de partenaires dans les 2 derniers mois/ 2 dernières années. Des partenaires ayant des relations sexuelles avec d'autres, pendant qu'ils sont dans une relations sexuelles avec vous ?
Prévention grossesse	Que faites-vous pour prévenir une grossesse?
Prévention ITSS	Que faites-vous pour prévenir les ITSS ?
Pratiques sexuelles	Relations sexuelles : Vaginales, anales, orales. Utilisation de préventifs – toujours, parfois, jamais. Quelles sont les circonstances dans lesquels vous n'utilisez pas les préventifs?
Antécédents d'ITSS	Avez-vous ou un/e partenaire déjà eu une ITSS ? Avez-vous ou un/e partenaire échangé du sexe pour des drogues, de l'argent ou autres choses ? money? Il y a autres choses au sujets de tes pratiques sexuelles que je devrais savoir pour mieux t'aider ?

Adapté de: <http://www.cdc.gov/std/treatment/2010/clinical.htm#shpc>

Conseil en prévention pour activité sexuelle	
Abstinence and réduction du nombre de partenaires sexuels	CDC
Préexposition immunitaire – Hépatite B, VPHV	CDC, ASPC
Préexposition immunitaire pour personne de corps natal masculin ayant des relations sexuels avec d'autres de corps natal masculin – Hépatites A	CDC, ASPC
Utilisation de préservatifs externes (masculin), préservatifs interne (féminin)	CDC, ASPC
Éducation sur les ITSS – signes, symptômes, transmission, facteurs de risque, pratique du sexe sécuritaire	ASPC
Nonoxynol 9 and augmentation du risque de transmission d'ITSS	CDC, ASPC
Dépistage de partenaire (ayant eu des relations sexuelles auparavant) pour tout jeune envisageant des relations sexuelles futures	ASPC
Acide folique – periconceptuel	SOGC, USPSTF
Contraception	SOGC
Contraception post-coïtal	SOGC, CDC

CDC <http://www.cdc.gov/std/tg2015/>

SOGC [sogc.org](http://sogc.org)

ASPC <http://www.phac-aspc.gc.ca/std-mts/sti-its/cgsti-ldcits/index-fra.php>

Carence en fer
Conseillez les populations à risque: encouragez la consommation d'un fer alimentaire, mesurez la ferritine chez ceux avec de multiples facteurs de risque et des symptômes cliniques.
Facteurs de risque:
Mauvaise alimentation
Facteurs socio-économique
Adolescent
Menstruation
Végétariens
Donneur de sang régulier
Certain groupes ethniques – Autochtones, Indo-canadiens
Symptômes: fatigue, agitation, trouble de l'attention et de l'hyperactivité (TDAH), irritabilité, retard pondéral, déficience cognitive et intellectuelle.
<a href="http://www.bcguidelines.ca/guideline_iron_deficiency.html">www.bcguidelines.ca/guideline_iron_deficiency.html</a>

Dépistage de la diabète sucrée, type II
Dépistez ceux à risque élevé selon les lignes directrices de pratique clinique
Lignes directrices pour jeunes gens (version anglaise) <a href="http://guidelines.diabetes.ca/Browse/Chapter35">http://guidelines.diabetes.ca/Browse/Chapter35</a>
Lignes directrices pour adultes (version anglaise) <a href="http://guidelines.diabetes.ca/Browse/Chapter4">http://guidelines.diabetes.ca/Browse/Chapter4</a>

© A.Greig 2018

Avertissement : Comme la nature des données probantes et les recommandations sont en constante évolution, la guide Greig se veut un simple guide. Les soins préventifs sont livrés épisodiquement ou lors de visites dédiées. Cet outil peut être utilisé en partie ou dans son ensemble.